

원에/수도용 제초제

❖ 「단골」의 콩밭 제초효과



❖ 「단골」의 들깨밭 제초효과



주의사항

1. 이 농약은 콩밭, 들깨밭 밭고랑(휴간)에 사용할 경우, 약액이 작물에 묻으면 잎이 타는 약해증상이 나타남으로 주의해서 사용해야 합니다.
2. 약을 뿌린 후 잡초가 말라죽기까지는 약 10일 정도 기간이 소요되므로 그 이전에는 재사용하는 일이 없도록 하고, 그 이후에 발생하는 잡초에 대하여는 1회에 한하여 더 사용할 수 있습니다.
3. 깨풀, 석류풀, 자귀풀, 까마중, 닭의장풀, 새포아풀, 광대나물, 소리쟁이, 어저귀, 달맞이꽃, 비름 등의 난방제잡초가 다발생한 곳의 경우 효과가 미흡할 수 있으니 사용에 주의하십시오.
4. 이 농약을 콩밭, 들깨밭, 논에 사용할 때 전착제, 비료 등과도 섞어서 사용하지 마십시오.
5. 약제 살포 후 4시간 이내에 비가오면 제초효과가 떨어질 수 있으므로 강우가 예상될 때는 사용하지 마십시오.
6. 사용 전에 표기내용을 확인하시고 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.

☎ 고객상담전화 : 1833-3231

• 대표전화 : (02) 3789-3800

• 안산공장 : (031) 493-1041

영업사무소

• 경기영업팀 : (031) 291-7090

• 강원영업팀 : (033) 765-8851

• 충북영업팀 : (043) 236-8857

• 충남영업팀 : (042) 826-6869

• 전북영업팀 : (063) 227-0762

• 전남영업팀 : (062) 511-6257

• 경남영업팀 : (055) 256-7705

• 경북영업팀(남부) : (053) 743-8345 • 경북영업팀(북부) : (053) 743-8345

* 본 기술자료는 2023년 3월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.

* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 안전사용기준 잘 지켜 우수농산물을 생산하십시오.

2023. 3

단골

미탁제

화본과 · 광엽 · 사초과잡초 전문 제초제

적용대상

[콩밭]밭고랑(휴간) 일년생잡초 [들깨밭]일년생잡초
 [기계이앙벼(어린이모), 건답직파벼]일년생잡초 및 다년생잡초
 [한국잔디]일년생잡초 및 다년생잡초



단골

미탁제

- ◆ 유효성분 및 함량 : Bentazone sodium(30%) + Fenoxaprop-P-ethyl(1%)
- ◆ 품목명 : 벤타존소듐+페녹사프로프-피-에틸 미탁제
- ◆ 계통 : 벤조치아디아지논계 +아릴옥시페녹시프로피오네이트계
- ◆ 작용기작 : H06+H01
- ◆ 포장단위 : 500ml



콩밭, 들깨밭 휴간(헛골)처리 전문 제초제

화본과·광엽·사초과 잡초를 한번에!

1

콩밭, 들깨밭 휴간(헛골)에 사용하는 제초제

밭에 많이 발생하는 화본과 잡초는 물론 광엽 및 사초과 잡초를 발생초기(3엽기 이내) 동시에 방제할 수 있습니다.

2

살포 15일 이후 완전고사

피, 바랭이, 명아주, 쇠비름 등 화본과잡초 및 광엽잡초 경엽살포시 흡수이행하여 3~5일후 생장이 정지하며, 10~15일후 고사됩니다.

3

빛물이나 토양에 의한 이동성이 없는 안전한 약제

잡초의 경엽에 살포하여 효과를 발휘하며, 땅에 떨어진 약제는 작물에 영향을 주지 않습니다.

4

수도 후기에 발생하는 잡초를 한번에 방제

잡초 발생 후 처리하는 경엽처리용 논제초제로 피, 올챙이고랭이, 올방개 등에 대한 제초효과가 우수합니다.

● 시험성적 들깨밭 휴간(헛골) 잡초 방제효과 (약제처리 20일후) / 정보화학 중앙연구소(2018, 경기 화성)



적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량		안전사용기준	
				약량	살포량	사용시기	사용횟수
콩밭	밭고랭(휴간) 일년생잡초	잡초생육기 (화본과잡초 3엽기이내) 밭고랭(휴간) 잡초 경엽처리	100ml	500ml	100ℓ	잡초발생기	-
들깨밭	일년생잡초	잡초생육기 (화본과잡초 3엽기이내) 밭고랭(휴간) 잡초 경엽처리				파종기	1회 이내
벼(건답직파)	일년생잡초 (피, 바랭이, 개기장, 여뀌바늘, 방동사니) 및 다년생잡초 (올챙이고랭이, 너도방동사니, 올방개)	파종후 20일 경엽처리 (피4엽기이내)				이앙기	
기계이앙벼 (어린이모)	일년생잡초 (피, 물달개비, 발독외물, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리) 및 다년생잡초 (올챙이고랭이, 올방개, 벼물)	이앙후 25일 경엽처리				잡초발생기	-
한국잔디	일년생잡초 및 다년생잡초	잡초생육기(화본과 3엽기이내) 경엽처리					

※ 콩밭/들깨밭 밭고랭(헛골)처리시 약제가 앞에 바산될 경우 잎이 타는 피해증상이 나타날 수 있으니 주의하여 살포하십시오.

「단골」의 방제가능 잡초



피



바랭이



방동사니



명아주



망초



강아지풀



미국가막사리



쇠비름



나팔꽃



별꽃



갈퀴덩쿨



냉이

「단골」의 방제 어려운 잡초



광대나물



까마중



깨풀



닭의장풀



자귀풀




사마귀풀



어저귀



달맞이꽃



털비름



석류풀



소리쟁이

※ 난방제잡초가 많은 포장에서는 비선택성제초제를 사용하여 방제 권장