

원예용 살균제


베지크린

입상수화제

역병 · 노균병 전문약

적용대상

[감자, 딸기]역병 [갯]노균병, 흰녹가루병 [들깨(잎)]노균병, 역병 [배추]노균병, 뿌리마름병
[멜론, 시금치, 오이, 양파, 참외, 포도, 상추(양상추포함)]노균병 [토마토(방울토마토포함)]잎마름역병



역병·노균병이
발병하는 작물에 등록
(PLS에 적합)



베지크린

입상수화제 / 아5

역병, 노균병 전문 약제



노균병

역병

노균병



- 유효성분 및 함량 : Benthiavalicarb-isopropyl(15%) ● 품목명 : 벤티아발리카브아이소프로필 입상수화제
- 계통 : 아미노에스테르아미드카바메이트계 ● 포장단위 : 100g, 250g

「베지크린」의 특징

• 병반확대 억제

강력한 침투이행성으로 병원균의 생육 억제를 통한 병징 확대 억제 효과

• 긴 잔효력

병원균의 전 생육단계를 억제함으로써 발병전부터 발병 중/후기까지 사용가능

● 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20 ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감자	역병	발병직전 7일간격, 경엽처리	6.7g	수확 7일전까지 사용	3회 이내
들깨(잎)	노균병	발병초 7일간격, 경엽처리	10g	수확 3일전까지 사용	2회 이내
	역병	발병초 10일간격, 경엽처리			
딸기	역병	발병초 7일간격, 관주처리	6.7g(150ml/주)	수확 14일전까지 사용	3회 이내
배추	노균병	발병초 10일간격, 경엽처리	10g		
	뿌리마름병				
시금치	노균병	발병초 7일간격, 경엽처리			
양파		발병초 10일간격, 경엽처리			
오이		발병초 7일간격, 경엽처리	수확 7일전까지 사용		
참외			수확 5일전까지 사용		
토마토 (방울토마토포함)	잎마름역병	발병초 7일간격, 경엽처리	6.7g	수확 3일전까지 사용	
포도	노균병		10g	수확 14일전까지 사용	
적확 갓	흰녹가루병			수확 7일전까지 사용	
적확 멜론	노균병			수확 14일전까지 사용	
상추(양상추포함)	노균병			수확 14일전까지 사용	

● 잠정안전사용 기준

「아래의 작물은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.
(2021년까지만 유효)」

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
산딸기	역병	발병초기, 경엽처리	20g	수확60일전까지 사용	1회 이내
적확 백출(곤팍삽주)	역병	발병직전, 경엽처리		수확45일전까지 사용	
적확 머위	흰가루병	발병초기, 경엽처리		수확14일전까지 사용	

● 노균병 약효시험

배추 노균병 약효시험



베지크린 처리



무처리



대조약제 A


양파 노균병 약효시험



베지크린 처리



무처리



대조약제 A

* 본 기술자료는 2020년용이므로 2020년에만 참고로 활용하십시오.

* 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.

* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 식물금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

* 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오.

* 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

고객상담전화
1833-3231