

수도용 제초제

삼박자

입제

이양동시 · 중기 제초제



적용대상

[기계이양벼 (어린이)][이양동시]] 일년생잡초 : 피, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘 / 다년생잡초 : 올방개, 벼물, 올챙이고랭이
 [기계이양벼 (어린이)] 일년생잡초 : 피, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘, 알방동사니 / 다년생잡초 : 올방개, 벼물, 올챙이고랭이
 [담수직파벼 (표면산파)] 일년생잡초 : 피, 물달개비, 알방동사니 / 다년생잡초 : 올방개, 벼물, 올챙이고랭이

성보화학
www.sbcc.kr

이양동시 처리가
가능한 안전한
이양동시·중기제초제

벼에는
안전!

이양동시처리
가능!

저항성잡초
방제에 탁월!

☎ 고객상담전화 : 1833-3231 • 서울사무소 : (02) 3789-3800 • 안산공장 · 부설연구소 : (031) 493-1041

영업사무소

• 수원사무소 : (031) 291-7090 • 원주사무소 : (033) 765-8851 • 청주사무소 : (043) 236-8857 • 대전사무소 : (042) 826-6869
 • 전주사무소 : (063) 227-0762 • 광주사무소 : (062) 511-6257 • 대구사무소 : (053) 743-8345 • 창원사무소 : (055) 256-7705
 • 제주사무소 : (064) 803-8999

* 본 기술자료는 2020년용이므로 2020년에만 참고로 활용하십시오.

* 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오.

* 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.

* 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 적용대상 작물과 잡초 이외에는 사용하지 마십시오.

성보화학

수도용
제초제

삼박자

입제 / 미분류+B+B

이양동시 · 중기 제초제



피

알방동사니

올챙이고랭이



●유효성분 및 함량 : Bromobutide(3%)+Pyrazosulfuron-ethyl(0.07%)+Pyriminobac-methyl(0.1%) ●품목명 : 브로모뷰타이드+피라조선틸퓨론에틸+피리미노박메틸 입제 ●계통 : 아마이드계+설폰일우레아계+피리미디닐옥시벤조익계 ●포장단위 : 3kg

「삼박자」의 특징

- 이양동시부터 중기처리까지 폭넓게 사용
이양동시부터 중기처리(피3엽기이내, 기타잡초 2~3엽기이내) 폭넓게 사용가능
- 다양한 벼 품종에 안전하게 사용
민감한 시기인 이양동시처리시에도 안전하게 사용가능하며, 유색미, 찰벼, 통일계통 벼에도 사용가능
- SU계 저항성 물달개비, 올챙이고랭이 등 효과 우수
SU계 저항성 물달개비(2엽기이내), 올챙이고랭이(3엽기이내) 사용시 효과적으로 방제가능
- 모든 처리 시기에 안전하게 사용
조생종 벼 재배, 보리나 밀 재배 후 2모작지역에서도 사용가능


이양동시 · 기계이양벼, 담수직파벼에도
사용가능한 안전한 제초제



적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용량
기계이양벼 (어린모)[이양동시]	일년생잡초: 피, 물달개비, 발독외물, 여뀌바늘 다년생잡초: 올방개, 벼풀, 올챙이고랭이	이양동시, 수면처리	3kg
기계이양벼 (어린모)	일년생잡초: 피, 물달개비, 발독외물, 여뀌바늘, 알방동사니 다년생잡초: 올방개, 벼풀, 올챙이고랭이	이양후 15일, 수면처리	
담수직파벼 (표면산파)	일년생잡초: 피, 물달개비, 알방동사니 다년생잡초: 올방개, 벼풀, 올챙이고랭이	파종후 15일, 수면처리	

효과적인 사용시기(이양동시)



이양동시 처리기 사용방법



이양동시처리시 효과적인 사용방법

- 논바닥의 정지작업을 균일하게 하고 모가 반드시 2cm이상 깊이 심기도록 합니다.
- 이양기에 부착된 살포기를 이용하여 1,000㎡(10a)당 1kg씩 전면에 골고루 뿌리십시오.
- 씨레질로부터 이양까지의 기간이 4일이상 길어질 경우에는 이양전 처리제를 뿌리시고 이양하십시오.
- 약을 뿌린 후 1일안에 논물을 반드시 대고 10일간 논물이 유지될 수 있도록 철저히 하시고, 물이 마르면 곧바로 물을 보충하십시오.
- 이양동시에 약제를 처리한 후에는 보식하지 마십시오.
- 정지작업 후 논물이 말라 논바닥이 굳어질 경우 이양동시 수면처리시 뿌리노출로 인해 약해가 발생할 수 있으니 주의하십시오.