

원예용 살충제

성보스카이

액상수화제

진딧물, 나방 전문 살충제

적용대상

[고추(단고추류포함)] 복숭아혹진딧물, 목화진딧물 [배] 꼬마배나무이 [배추] 무테두리진딧물, 파밤나방 [복숭아] 복숭아순나방 [사과] 복숭아순나방, 조팝나무진딧물, 사과혹진딧물



☎ 고객상담전화 : 1833-3231 • 서울사무소 : (02) 3789-3800 • 안산공장 : (031) 493-1041

영업사무소

경기영업팀 : (031) 291-7090 강원영업팀 : (033) 765-8851 충북영업팀 : (043) 236-8857 충남영업팀 : (042) 826-6869
 전북영업팀 : (063) 227-0762 전남영업팀 : (062) 511-6257 제주영업 : (02) 3789-3800
 경남영업팀 : (055) 256-7705 경북영업팀(남부) : (053) 743-8345 경북영업팀(북부) : (053) 743-8345

* 본 기술자료는 2022년 11월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.

2022. 11

* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오

* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.



진딧물, 나방 전문약제

원예용 살충제

성보스카이

액상수화제



- 저독성(IV) 어독성 I급
- 유효성분 및 함량 : Flufenoxuron(4%)+Sulfoxafloor(6.2%)
- 품목명 : 플루페녹수론+설폭사플로르 액상수화제
- 작용기작 번호 : 15+4c
- 포장단위 : 100ml, 250ml

1

진딧물, 나방 동시방제 약제

진딧물과 나방에
우수한 두가지 성분의 혼합제

2

넓은 방제 스펙트럼과 높은 안전성

약효가 빠르게 나타나며
약효지속기간이 길며 작물에 안전

적용대상 및 사용량


작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
고추 (단고추류포함)	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	2,000배 (10㎖)	수확 3일전까지	2회 이내
	목화진딧물				
배	꼬마배나무이			수확 14일전까지	3회 이내
배추	무테두리진딧물				2회 이내
	파밤나방	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 7일전까지	3회 이내
복숭아	복숭아순나방				
사과	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리		수확 21일전까지	
	사과혹진딧물				

「성보스카이」처리 후 진딧물 치사 사진



「성보스카이」우수한 살충효과

■ 사과 사과혹진딧물 약효시험(2013, 정보화학 중앙연구소)




「성보스카이」



무처리

■ 고추 목화진딧물 약효시험(2013, 정보화학 중앙연구소)





「성보스카이」



무처리

■ 배추 무테두리진딧물 약효시험(2013, 정보화학 중앙연구소)



「성보스카이」




무처리

주요 방제 해충



복숭아혹진딧물



목화진딧물




꼬마배나무이



무테두리진딧물



파밤나방



복숭아순나방



사과혹진딧물 피해



조팝나무진딧물