

원예용 살균제

성보싸이클린

수화제

화상병 · 세균병 · 빛자루병 전문 살균제

적용대상

[감귤] [감초] [갯] [고추(단고추류포함)] [기장] [나디아] [대추] [딸기] [레몬(라임포함)] [마늘] [매실] [배] [배추] [복숭아] [부추] [비트] [사과] [살구] [삼주] [상추(양상추포함)] [셀러리] [수박] [썩갯] [양미나리(셀러리)] [양배추] [양앵두(체리)] [열무] [오이] [자두] [참다래(키위)] [치커리] [콩] [토마토(방울토마토포함)] [파(쪽파포함)] [플럼코트] [향미나리(파슬리)]



잠정안전사용 기준

「아래의 작물은 약효를 검증하지 않았으므로 병세가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다. (2021년까지만 유효)」

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
백출(큰꽃삼주)	세균썩음병	발병초기, 경엽처리	10g	수확 45일전까지 사용	1회 이내
적화 플럼코트	세균성구멍병		20g	수확14일전까지 사용	3회 이내



세균병에는 항생제인 성보싸이클린을 추천해 드립니다.

☎ 고객상담전화 : 1833-3231 • 서울사무소 : (02) 3789-3800 • 안산공장·부설연구소 : (031) 493-1041

영업사무소

• 수원사무소 : (031) 291-7090 • 원주사무소 : (033) 765-8851 • 청주사무소 : (043) 236-8857 • 대전사무소 : (042) 826-6869
• 전주사무소 : (063) 227-0762 • 광주사무소 : (062) 511-6257 • 대구사무소 : (053) 743-8345 • 창원사무소 : (055) 256-7705
• 제주사무소 : (064) 803-8999

* 본 기술자료는 2020년용이므로 2020년에만 참고로 활용하십시오. * 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오.
* 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오. * 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 작물금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.
* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.



원예용 살균제

성보싸이클린

수화제 / 라5

세균병 전문 약제



- 유효성분 및 함량 : Oxytetracycline calcium alkeyltrimethylammonium(17%)
- 품목명 : 옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 수화제
- 계통 : 항생제
- 포장단위 : 100g, 200g, 400g

「성보싸이클린」의 특징

● 확실한 효과

대부분의 세균성 병해에 대한 강력한 효과를 가집니다.

● 저항성 ZERO

저농도에서는 리보솜의 아미노산 합성을 억제하고 고농도에서는 세포벽 합성을 억제하는 2가지 작용기작을 가집니다.

● 작물 전용 항생제

동물용 항생제와 차별화된 Pizer의 40년 제제 공업으로 만들어 전세계적으로 유통되는 오리지널 제품입니다.

배/사과 화상병 예방이 방제의 첫걸음

● 화상병 방제는?

배나무 및 사과나무의 개화기에 꿀벌 및 해충에 의하여 꽃에 감염(화기전염)

- 동계소독을 통한 주변 소독
- 개화기에 전문약제를 살포하여 2차 감염 억제가 필수

방제 포인트

발생지역 및 인근지역	동계처리	1차, 아그리마이신(수)	2차, 타약제(체계처리)
발생지역	동계처리	1차, 성보싸이클린(수) ★감염 억제★	2차, 아그리마이신(수) ★병 확산 억제★



● 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20L 당 사용약량	1,000㎡(10a) 당 사용량	안전사용기준	
					사용시기	사용횟수
감귤	퀘양병	새순군기 전부터 15일간격, 경엽처리	20g	약액이 충분히 문도록 끌고루 뿌림	수확 7일전까지 사용	3회 이내
감초	세균점무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리			수확 14일전까지 사용	
고추 (단고추류포함)					수확 3일전까지 사용	
기장	세균줄무늬병			수확 30일전까지 사용	2회 이내	
대추	빗자루병	4월초, 주간주입	100g	1ℓ / 주, 흉고직경 10cm		
딸기	세균모무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리	20g		수확 3일전까지 사용	3회 이내
마늘	무름병	발병직전 7일간격, 경엽처리			수확 45일전까지 사용	
매실	퀘양병	낙후직후부터 10일간격, 경엽처리			수확 30일전까지 사용	
배	화상병	만개5일후, 경엽처리	10g		수확 40일전까지 사용	3회 이내
배추	무름병	발병직전부터 7일간격, 경엽처리	20g		수확 14일전까지 사용	
복숭아	세균구멍병	발병초 10일간격, 경엽처리	10g		수확 7일전까지 사용	
사과	화상병	만개5일후, 경엽처리			수확 40일전까지 사용	3회 이내
살구	세균구멍병	발병직전 10일간격, 경엽처리			수확 7일전까지 사용	
샬러리	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리			수확 30일전까지 사용	
수박	과일썩음병	발병 초기부터 7일간격, 경엽처리			수확 3일전까지 사용	1회 이내
양행두(체리)	세균구멍병	발병직전 10일간격, 경엽처리			수확 3일전까지 사용	
열무	세균검은무늬병	발병전 7일간격, 경엽처리			수확 3일전까지 사용	
오이	세균모무늬병	발병직전 7일간격, 경엽처리			수확 14일전까지 사용	3회 이내
자두	세균구멍병	발병초 7일간격, 경엽처리			수확 7일전까지 사용	1회 이내
청경채	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리				
콩	들불병	발병초 10일간격, 경엽처리			수확 14일전까지 사용	
	불마름병	발병초 7일간격, 경엽처리				
도마토 (방울도마토포함)	세균점무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리			수확 3일전까지 사용	3회 이내
	퀘양병	발병초(정식 30일후)10일간격, 경엽처리			수확 7일전까지 사용	
적합 치커리	무름병	발병직전 7일간격, 경엽처리	20g	약액이 충분히 문도록 끌고루 뿌림	수확 21일전까지 사용	3회 이내
적합 참다래(키위)	퀘양병	발병직전 10일간격, 경엽처리			수확 14일전까지 사용	
적합 레몬(라임포함)	퀘양병	발병초 7일간격, 경엽처리			수확 7일전까지 사용	
적합 갓	무름병				수확 7일전까지 사용	2회 이내
적합 나디아	검은점무늬병	발병직전 10일간격, 경엽처리			수확 14일전까지 사용	
적합 대추	세균열매썩음병				수확 30일전까지 사용	
적합 부추	무름병	발병직전 7일간격, 경엽처리			수확 14일전까지 사용	3회 이내
적합 비트					수확 7일전까지 사용	
적합 살구	검은점무늬병	발병직전 10일간격, 경엽처리			수확 30일전까지 사용	3회 이내
적합 삼주	세균썩음병				수확 7일전까지 사용	
적합 상추 (양상추포함)	무름병	발병직전 7일간격, 경엽처리			수확 21일전까지 사용	
적합 썩갓					수확 7일전까지 사용	
적합 양미나리 (샬러리)					수확 14일전까지 사용	
적합 양배추	검은점무늬병	발병직전 10일간격, 경엽처리			수확 7일전까지 사용	3회 이내
적합 자두	검은점무늬병	발병직전 10일간격, 경엽처리			수확 14일전까지 사용	2회 이내
적합 파 (쪽파포함)	무름병	발병직전 7일간격, 경엽처리			수확 7일전까지 사용	3회 이내
적합 플럼코트	세균구멍병	발병직전 10일간격, 경엽처리			수확 14일전까지 사용	3회 이내
적합 향미나리 (파슬리)	무름병	발병직전 7일간격, 경엽처리			수확 7일전까지 사용	