

원예용 살균제

성보크린

수화제

세균병 전문 살균제

적용대상

[감귤, 매실]궤양병 [고추(단고추류포함)]세균점무늬병 [마늘, 배추]무름병 [복숭아, 자두]세균구멍병
[양파]구석음병 [오이]세균모무늬병 [토마토(방울토마토포함)]썩마름병



성보화학
www.sbcc.kr

세균병 싹~



☎ 고객상담전화 : 1833-3231 • 서울사무소 : (02) 3789-3800 • 안산공장·부설연구소 : (031) 493-1041

영업사무소

• 수원사무소 : (031) 291-7090 • 원주사무소 : (033) 765-8851 • 청주사무소 : (043) 236-8857 • 대전사무소 : (042) 826-6869
• 전주사무소 : (063) 227-0762 • 광주사무소 : (062) 511-6257 • 대구사무소 : (053) 743-8345 • 창원사무소 : (055) 256-7705
• 제주사무소 : (064) 803-8999

* 본 기술자료는 2020년용이므로 2020년에만 참고로 활용하십시오.

* 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오.

* 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.

* 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

성보화학

원예용
살균제

성보크린

수화제 / 라5+아3

세균병 전문 약제



무름병



세균구멍병



세균점무늬병



● 유효성분 및 함량 : Oxytetracycline calcium alkyltrimethylammonium(5%)+Validamycin A(15%)
● 품목명 : 옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄+발리다마이신이 수화제 ● 계통 : 항생제+항생제 ● 포장단위 : 100g, 250g

「성보크린」의 특징

● 광범위 세균병해 활성 우수

옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄은 병원균에 직접 활성을 나타내며, 발리다마이신은 식물체의 저항성 물질을 촉진시킵니다.

● 강력한 침투이행성

식물체 표면에 강력하게 경합하여 신속히 작물내로 흡수이행되어 효과를 발휘합니다.

● 2 TYPE 작용기작

옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄은 병원균에 직접 활성을 나타내며, 발리다마이신은 식물체의 저항성 물질을 촉진시킵니다.

● 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감귤	궤양병	새순 굽기전부터 15일간격, 경엽처리	10g	수확 14일 전까지 사용	3회 이내
고추 (단고추류포함)	세균점무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리	20g	수확 3일 전까지 사용	
마늘	무름병		10g	수확 30일 전까지 사용	2회 이내
매실	궤양병	낙화직후부터 10일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지 사용	3회 이내
배추	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리			2회 이내
복숭아	세균구멍병	발병직전 10일간격, 경엽처리			3회 이내
양파	구석응병	발병초 7일간격, 경엽처리	10g	수확 3일 전까지 사용	
오이	세균모무늬병			수확 7일 전까지 사용	
자두	세균구멍병	발병직전 10일간격, 경엽처리		수확 2일전까지 사용	
적외 토마토 (방울토마토포함)	꽃마름병	발병직전 7일간격, 관주처리	10g(250mℓ/주)	수확 2일전까지 사용	

● 시험성적

배추 무름병 약효시험



성보크린




무처리



A약제

마늘 무름병 약효시험



성보크린



무처리



A약제



B약제



C약제

● 방제효과

배추 무름병 약효시험



성보크린 처리



무처리



A약제 처리

마늘 무름병 약효시험



성보크린 처리



무처리



A약제 처리