

수도용 살균제



씨드캡

종자처리액상수화제 / 다3

종자소독 전용 살균제

적용대상

[벼] 종자소독(키다리병, 도열병, 깨씨무늬병)
[마늘] 흑색썩음균핵병



- ▶ 신규물질로 기존 약제와 교차 저항성이 없습니다.
- ▶ 침달성이 높아 종자내부로 감염된 도열병 및 키다리병 병원균을 효과적으로 방제하며, 법씨 표면에 부착한 깨씨무늬병까지 효과적으로 방제합니다.
- ▶ 병원균 생장을 위한 호흡 과정을 억제하여 예방 및 치료효과를 나타냅니다.

씨드캡

종자처리액상수화제 / 다3

저독성(Ⅳ) 어독성Ⅱ급

볍씨 종자소독 전문 살균제



키다리병



깨씨무늬병



앞도열병



· 유효성분 및 함량 : Pyribencarb(20%) · 품목명 : 피리벤카브 종자처리액상수화제 · 계통 : 벤질카바메이트계 · 포장단위: 100ml

볍씨 발아기 사용방법



① 물통준비



② 볍씨 채우기



③ 종자소독 및 키다리병 전문약제 희석

키다리병 방제는
볍씨가 충분히 잠기는 것이 중요



④ 30℃ 온도설정

온도가 30℃에 도달한 후 부터
48시간 침지



⑤ 물빼기/물거르기 실시



⑥ 발아(최아) 확인

약액 제거 후
싹 틔우기 실시



효과적인 사용방법

- ▶ 침지처리 : 약제를 1,000배로 희석한 다음 30℃에서 48시간동안 침지하여 주십시오.
- ▶ 볍씨 발아기를 사용시 침지시간(48시간), 침지온도(30℃)를 준수하여 주십시오.
- 침지시간 : 수온이 30℃에 도달한 이후부터 48시간
- ▶ 발아기가 없는 경우, 상온(20℃)에서 침지를 권장합니다.
- ▶ 싹틔우기를 하여 발아(최아)된 것을 확인 후 파종하여 주십시오.

주의사항

1. 침종시간 및 온도를 준수하지 않았을 시에는 효과 저조 우려가 있습니다.
2. 자가채종 종자는 병원균의 감염율이 높아 약효 저조의 우려가 있으므로,
볍씨거르기 및 온탕소독 등 체계적인 종자소독이 필요합니다.
3. 침투보조제 혼용시 발아불량 및 생육억제 등의 약해 우려가 있으므로, 혼용하지 마십시오.

적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	사용량
벼	종자소독 (키다리병, 도열병, 깨씨무늬병)	파종전 종자kg당 약액 1.1ml를 물 8.9ml에 희석하여 건종자 분무처리	원액 1.1ml/ 종자kg	-
		파종전 48시간 침지처리(30℃)	20ml	볍씨가 약액에 충분히 침지
마늘	흑색썩음균핵병	파종전 종구 24시간 침지처리		종구가 약액에 충분히 침지

* 본 기술자료는 2020년 12월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.

* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

2021. 1



고객상담전화
1833-3221