

수도/원예용 살충제

엄선

액상수화제

수도 무인항공기 · 과수 나방, 깍지벌레 전문약

적용대상

[벼]벼멸구, 벼멸구(무인항공기), 이화명나방(1화기), 이화명나방(2화기), 흑명나방 [복숭아, 자두]뽕나무깍지벌레
[배]가루깍지벌레, 애모무늬잎말이나방 [감귤]네눈썹가지나방, 화살깍지벌레 [감(단감포함)]감나무주머니깍지벌레



해충을
엄격한
기준으로
잡다

엄선

액상수화제 / 16+18

수도/과수 전문 살충제



벼멸구

흑명나방

가루깍지벌레



- 유효성분 및 함량 : Buprofezin(24%)+Chromafenozide(5%) ● 품목명 : 뷰프로페진+크로마페노자이드 액상수화제
- 계통 : 치아디아진게+벤조일하이드라자이드계 ● 포장단위 : 250ml, 355ml, 500ml

「엄선」의 특징

· 수도 무인항공기 등록약제

무인항공기 방제가 가능한 살충제

· 과수 깍지벌레, 나방 전문

한번처리로 과수에 발생하는 깍지벌레와 나방을 동시에 방제

뷰프로페진

키틴 생합성 저해(이상탈피, 탈피억제) - 다음 링기로 성장을 위해 탈피시 외골격(큐티클층) 형성을 못하여 치사시킴

크로마페노자이드

탈피호르몬 유사체(탈피촉진 유도) - 탈피호르몬 수용체에 탈피호르몬처럼 작용하여 성장이 되지 않았음에도 불구하고 탈피를 강제로 유도하여 치사시킴

수도 해충 발생 생태



벼멸구

- 5월부터 비래 시작
- 주 비래시기(7월 하순)
- 8월 상순(방제적기)



흑명나방

- 6~7월 비래
- 7월 하순 ~ 9월 하순 피해
- 7월(방제적기)



잎을 세로로 말아 가해



이화명나방

- 1화기 : 6월 하순(방제적기)
- 2화기 : 8월 중순(방제적기)



줄기 가해로 백수현상

적용대상 및 사용량

작물명	적용해충	사용시기 및 방법	물 20 ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량		안전사용기준		
				약량	살포량	사용시기	사용횟수	
벼	벼멸구	다발생기 경엽처리	10㎖	70~80㎖	140~160 ℓ	수확 14일전까지	2회 이내	
	벼멸구 (무인항공기)		1,250㎖	50㎖	0.8 ℓ	수확 30일전까지	1회 이내	
	이화명나방 (1화기)	발아최성기 10~18일후 경엽처리	10㎖	70~80㎖	140~160 ℓ	수확 14일전까지	2회 이내	
	이화명나방 (2화기)							발아최성기 5~7일후 경엽처리
	흑명나방							
복숭아	뽕나무깍지벌레	약충다발생기 경엽처리						수확 14일전까지
자두								수확 7일전까지
배	가루깍지벌레	다발생기 경엽처리	13.3㎖	약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림	수확 21일전까지			
	애모무늬잎말이나방				수확 14일전까지			
감귤	네눈썹가지나방					수확 14일전까지		
	화살깍지벌레							
감 (단감포함)	감나무주머니 깍지벌레				10㎖			

* 본 기술자료는 2022년 5월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.

* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

2022. 6

고객상담전화
1833-3231