

원예용 살충제

응원

분산성액제

응애 전문약



적용대상

[가지, 감(단감포함), 국화, 딸기, 멜론, 배, 복숭아, 수박(복수박포함), 자두, 장미, 참외]점박이응애
 [감귤]꿀응애 [고추(단고추류포함), 들깨(잎)]차면지응애 [사과]사과응애, 점박이응애

 **성보화학**
 www.sbcc.kr

응애방제에 넘버원!

☎ 고객상담전화 : 1833-3231 • 서울사무소 : (02) 3789-3800 • 안산공장·부설연구소 : (031) 493-1041

영업사무소

• 수원사무소 : (031) 291-7090 • 원주사무소 : (033) 765-8851 • 청주사무소 : (043) 236-8857 • 대전사무소 : (042) 826-6869
 • 전주사무소 : (063) 227-0762 • 광주사무소 : (062) 511-6257 • 대구사무소 : (053) 743-8345 • 창원사무소 : (055) 256-7705
 • 제주사무소 : (064) 803-8999

* 본 기술자료는 2020년용이므로 2020년에만 참고로 활용하십시오.

* 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오.

* 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.

* 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

 **성보화학**

원예용
살충제

응원

분산성액제 / 25a

- 유효성분 및 함량 : Cyflumetofen(10%) ● 품목명 : 사이플루메토펜 분산성액제
- 계통 : 벤조일아세토니트로닐계 ● 포장단위 : 200ml, 500ml

응애 전문 약제



차면지응애 피해

사과응애

점박이응애




「응원」의 특징

- 빠른 약효 및 살충효과
약제 접촉시 빠르게 치사
- 전세대 방제
알부터 성충까지 방제
- 작물부착성 우수
작물에 살포시 약제가 잘 부착되어
약효가 잘 발현

방제효과


약제에 직접 접촉

약제 처리
3시간 이내로 치사



약제가 처리된 잎에 접촉

처리된 잎 6시간 이전



제형적 이점으로 인하여 약제가 잎에 잘 부착되며, 약효가 빠르게 나타납니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	점박이응애	한잎당 3~5마리 발생시, 경엽처리	20ml	수확 3일전까지 사용	2회 이내
감 (단감포함)		한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리		수확 14일전까지 사용	3회 이내
감귤	굴응애			수확 2일전까지 사용	2회 이내
고추 (단고추류포함)	차면지응애	신초피해 발생초기, 경엽처리		-	-
국화	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리		수확 3일전까지 사용	3회 이내
적합 들깨(잎)	차면지응애	신초피해 발생초기, 경엽처리		수확 2일전까지 사용	2회 이내
적합 딸기	점박이응애	한잎당 3~5마리 발생시, 경엽처리		수확 14일전까지 사용	3회 이내
멜론					
배					
복숭아					
사과	사과응애	한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리		수확 7일전까지 사용	2회 이내
수박 (복수박포함)	점박이응애	한잎당 3~5마리 발생시, 경엽처리			
자두		한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리			
장미		한잎당 3~5마리 발생시, 경엽처리			
적합 참외		한잎당 3~5마리 발생시, 경엽처리			

잠정안전사용 기준

「아래의 작물은 약효를 검증하지 않았으므로 방제가 꼭 필요하나 사용할 농약이 없는 경우에만 사용하시기 바랍니다.
(2021년까지만 유효)」

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
나디아	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리	20ml	수확 45일전까지 사용	1회 이내
대추	응애류	발생초기, 경엽처리		수확 60일전까지 사용	

방제효과

응원은
알과 부화직후 유충에
효과가 우수하여
응애 방제에
우수한 효과를 나타냅니다.