



따라올 수 없는 명성 - 카스텔란

오랜 시간 동안 검증된 약효로 원예농가와 함께해온 카스텔란!
그 믿음과 신뢰를 바탕으로 보다 건강한 작물생산에 함께합니다.

카스텔란

흑색썩음균핵병 전문약



■ 주요 방제 병해



양파/흑색썩음균핵병



마늘/흑색썩음균핵병



마늘/잎마름병

- ※ 입제 적용대상 : 마늘, 양파, 파[쪽파포함](흑색썩음균핵병)/ 고추[단고추류포함](흰비단병)/ 상추[양상추포함](균핵병)
※ 수화제 적용대상 : 달래, 양파, 파(흑색썩음균핵병)/ 마늘(잎마름병, 흑색썩음균핵병)/ 감[단감포함](동근무늬낙엽병)/
감굴(더덩이병)/ 국화(흰녹병)/ 더덕(녹병)/ 배(검은별무늬병, 붉은별무늬병)/ 복숭아(잣빛무늬병)/
뽕나무(오디균핵병)/ 사과(갈색무늬병, 검무늬썩음병, 점무늬낙엽병)/ 수국, 참외(흰가루병)/
수박(덩굴마름병)/ 오이(검은별무늬병, 흰가루병)/ 토마토(잎곰팡이병)/ 포도(갈색무늬병)

고객상담전화
1833-3231

- * 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오.
- * 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
- * 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

- * 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.
- * 안전사용기준 잘 지켜 우수농산물을 생산하십시오.

『카스텔란 수화제』 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격, 경엽처리	10g	수확 14일전까지 사용	4회 이내
감귤	더듬이병	춘지발생초 15일간격, 경엽처리		수확 40일전까지 사용	3회 이내
국화	흰녹병	발병초 7일간격, 경엽처리		-	-
달래	흑색썩음균핵병	파종전, 중구 침지처리	40g	파종기	1회 이내
더덕	녹병	발병초 10일간격, 경엽처리	10g	수확 7일전까지 사용	4회 이내
마늘	잎마름병		중구, 침지처리	40g	수확 21일전까지 사용
	흑색썩음균핵병	중구 파종전 1회, 분의처리		2g/kg	
	배	검은별무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	6.7g	수확 30일전까지 사용
붉은별무늬병					
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리	10g	수확 20일전까지 사용	
뽕나무	오디균핵병		6.7g	수확 21일전까지 사용	2회 이내
사과	갈색무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	10g	수확 30일전까지 사용	5회 이내
	겉무늬썩음병	6월 중순부터 10일간격, 경엽처리	20g		
	점무늬낙엽병	발병초 10일간격, 경엽처리	10g		
수국	흰가루병	발병초 7일간격, 경엽처리	20g	-	-
수박	덩굴마름병		10g	수확 14일전까지 사용	4회 이내
양파	흑색썩음균핵병	정식전, 뿌리 침지처리	40g	파종기	1회 이내
오이	검은별무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	10g	수확 5일전까지 사용	2회 이내
	흰가루병		6.7g		
참외				10g	수확 7일전까지 사용
토마토	잎곰팡이병	발병초 7일간격, 경엽처리	6.7g	수확 3일전까지 사용	2회 이내
파	흑색썩음균핵병	정식전, 뿌리 침지처리	40g	파종기	1회 이내
포도	갈색무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	10g	수확 30일전까지 사용	3회 이내

『카스텔란 입제』 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a) 당 사용량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
양파	흑색썩음균핵병	정식전 토양혼화처리	4kg	정식기	1회 이내
적용 파	흑색썩음균핵병				
마늘	흑색썩음균핵병	파종전 토양전면처리			
고추 (단고추류포함)	흰비단병	정식직후 주원처리	1g/주	정식직후	
파 (쪽파포함)	흑색썩음균핵병	정식전 토양혼화처리	4kg	정식기	
적용 상추 (양상추포함)	균핵병				