

원예용 살균제

# 카스티요

액상수화제 / 사1+다2

사과, 배 개화기/흑색썩음균핵병 전문 살균제

적용대상

[사과] 갈색무늬병, 겹무늬썩음병 [배] 검은별무늬병, 붉은별무늬병  
[마늘] 잎마름병, 흑색썩음균핵병 [파(쪽파포함)] 흑색썩음균핵병  
[양파] 검은무늬병, 흑색썩음균핵병



원예용  
살균제

# 카스티요

액상수화제 / 사1+다2

저독성(IV) 어독성 II급

사과, 배 개화기/흑색썩음균핵병 전문 약제



사과/갈색무늬병



배/붉은별무늬병



양파/흑색썩음균핵병



· 유효성분 및 함량 : Fluquinconazole(12%)+Fluxapyroxad(4.5%) · 품목명 : 플루킨코나졸+플록사피록사드 액상수화제  
· 계통 : 퀴나졸린트리아졸계+카복사마이드계 · 포장단위: 250ml

## 「카스티요」의 특징

- 개화기 및 유과기에 안전하게 사용할 수 있는 살균제입니다.
- 원균의 포자의 침입 및 발아를 억제하고, 세포벽 합성을 억제함으로써 균사의 성장을 억제하여 병원균의 생육 전반에 효과를 나타냅니다.

### [사과 & 배 개화기]



「카스티요」는 사과 & 배 월동후부터 개화기까지 안전하게 사용 가능

### [마늘 잎마름병 방제효과]

카스티요 처리구

무처리구



### 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
사과	겉무늬썩음병	6월상순부터 10일간격 경엽처리	10ml	수확 21일전까지 사용	3회 이내
	갈색무늬병				
배	검은별무늬병	발병초기 10일간격 경엽처리	10ml	수확 7일전까지 사용	3회 이내
	붉은별무늬병				
마늘	잎마름병	발병초 10일간격 경엽처리	20ml	파종기	1회 이내
	흑색썩음균핵병	파종전, 종구 침지처리(24시간) 파종전, 토양전면처리	10ml(100ℓ / 10a)		
양파	검은무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리	10ml	수확 7일전까지 사용	3회 이내
	흑색썩음균핵병	정식전, 육묘상 관주처리	20ml(3ml/주)	정식기	1회 이내
파(쪽파포함)	정식전				

\* 본 기술자료는 2020년 12월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.

\* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

\* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

\* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

2021. 1



고객상담전화  
1833-3221