

원예용 살균제

코리스

액상수화제

IPM용 종합살균제

적용대상

[감(단감포함)]등근무늬낙엽병 [감귤]더듬이병, 잣빛곰팡이병 [고추(단고추류포함)]흰가루병 [대추, 딸기]잣빛곰팡이병
[마늘]흑색썩음균핵병 [매실]흰가루병 [배]검은별무늬병 [복숭아]잣빛무늬병 [수박(복수박포함)]덩굴마름병 [오이, 참외]흰가루병
[사과]갈색무늬병, 검무늬썩음병, 점무늬낙엽병, 탄저병 [포도]갈색무늬병, 잣빛곰팡이병 [호박(단호박포함)]검은별무늬병



과실의 어머니 코리스

어머니의 품속처럼 과실 하나 하나를
소중하게 지켜드립니다.



코리스

액상수화제 / 다2+다3

종합살균제



흰가루병

검무늬썩음병

잣빛곰팡이병



- 유효성분 및 함량 : Boscalid(18.2%)+Kresoxim-methyl(9.1%) ● 품목명 : 보스칼리드+크레속심메틸 액상수화제
- 계통 : 아닐라이드계+스트로빌루린계 ● 포장단위 : 100mL, 200mL, 250mL

「코리스」의 특징

• 복합 작용점

전자전달계의 두 지점을 저해하여 약효를 보완, 상승시켜 저항성을 회피

• 유효성분의 표면확산 침투성 및 침달성

식물체에 살포된 유효성분은 특이한 표면확산침투성과 침달효과가 있어 약액이 묻지않은 발병부위에도 우수한 방제효과를 나타냄

적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
감(단감포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격, 경엽처리	8mℓ	수확 14일전까지 사용	4회 이내	
감귤	더듬이병	춘지 발생초 15일간격, 경엽처리				
	잿빛곰팡이병	발병초 10일간격, 경엽처리				
고추 (단고추류포함)	흰가루병		10mℓ	수확 3일전까지 사용	2회 이내	
대추	잿빛곰팡이병	발병초기 7일간격, 경엽처리	8mℓ	수확 7일전까지 사용	3회 이내	
딸기		발병초 7일간격, 경엽처리	20mℓ	수확 2일전까지 사용		
마늘	흑색썩음균핵병	종구 파종 후(복토 전), 분무처리	20mℓ (150ℓ/10a)	파종후	1회 이내	
매실	흰가루병	발병초 7일간격, 경엽처리	20mℓ	수확 14일전까지 사용	2회 이내	
배	검은별무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	8mℓ	수확 20일전까지 사용	4회 이내	
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 7일전까지 사용		
사과	갈색무늬병			6월 중순부터 10일간격, 경엽처리	수확 30일전까지 사용	5회 이내
	검무늬썩음병					
	점무늬낙엽병	발병초 10일간격, 경엽처리				
	탄저병	6월 중순부터 10일간격, 경엽처리				
수박 (복수박포함)	덩굴마름병	발병초 7일간격, 경엽처리	10mℓ	수확 14일전까지 사용	3회 이내	
오이	흰가루병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 2일전까지 사용		
참외				수확 3일전까지 사용	4회 이내	
포도	갈색무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	8mℓ	수확 21일전까지 사용		
	잿빛곰팡이병		10mℓ			
호박 (단호박포함)	검은별무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 3일전까지 사용	3회 이내	

* 본 기술자료는 2020년용이므로 2020년에만 참고로 활용하십시오.

* 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.

* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

* 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오.

* 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

고객상담전화
1833-3231