

원예용 살충제

트립솔

유탕제

총채벌레 · 응애 전문약

적용대상

[고추(단고추류포함)]꽃노랑총채벌레, 차먼지응애, 담배나방 [딸기]점박이응애 [오이]오이총채벌레
[사과]복숭아순나방 [수박(복수박포함)]아메리카잎굴파리 [부추]뿌리응애 [배]꼬마배나무이, 점박이응애
[참외]꽃노랑총채벌레, 뿌리혹선충 [파(쪽파포함)]파총채벌레



과수 · 전작
한방에
해충퇴치



☎ 고객상담전화 : 1833-3231 • 서울사무소 : (02) 3789-3800 • 안산공장 · 부설연구소 : (031) 493-1041

영업사무소

- 수원사무소 : (031) 291-7090 • 원주사무소 : (033) 765-8851 • 청주사무소 : (043) 236-8857 • 대전사무소 : (042) 826-6869
- 전주사무소 : (063) 227-0762 • 광주사무소 : (062) 511-6257 • 대구사무소 : (053) 743-8345 • 창원사무소 : (055) 256-7705
- 제주사무소 : (064) 803-8999

* 본 기술자료는 2020년용이므로 2020년에만 참고로 활용하십시오. * 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오.
* 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오. * 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.
* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.




원예용
살충제

트립솔

유탕제 / 6+3a

총채벌레 미소해충 전문 약제



점박이응애



꽃노랑총채벌레



차면지응애 피해



- 유효성분 및 함량 : Abamectin(1.3%)+Acrinathrin(2.3%) ● 품목명 : 아바멕틴+아크리나트린 유탕제
- 계통 : 항생제+합성피레스로이드계 ● 포장단위 : 100mL, 250mL

「트립솔」의 특징

• 총채벌레 전문약

총채벌레에 효과가 좋은 두가지 성분의 약제입니다.

• 다양한 해충을 동시에 방제

한번처리로 응애, 꼬마배나무이, 굴파리를 방제합니다.

• 바이러스 예방

바이러스병을 매개하는 총채벌레를 방제함으로써 바이러스를 예방합니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용해충	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
고추 (단고추류포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격, 경엽처리	10mL	수확 2일전까지 사용	2회 이내
	차면지응애	신초피해 발생초기, 경엽처리			
	적합 담배나방	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 3일전까지 사용	3회 이내
딸기	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리		수확 14일전까지 사용	
배	꼬마배나무이	다발생기, 경엽처리		수확 3일전까지 사용	2회 이내
	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리		수확 2일전까지 사용	
수박 (복수박포함)	아메리카잎굴파리			수확 14일전까지 사용	
오이	오이총채벌레				
적합 참외	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격, 경엽처리			
적합 파(쪽파포함)	파총채벌레				
적합 사과	복숭아순나방				
적합 참외	뿌리혹선충	정식후, 토양관주처리	10mL(2ℓ / m ²)	정식기	1회
적합 부추	뿌리응애	발생초기 토양관주처리	10mL(1ℓ / m ²)	수확 21일전까지 사용	1회 이내

총채벌레와 차면지응애의 피해비교



〈총채벌레 피해〉



〈차면지응애 피해〉



〈차면지응애 다발생 피해〉

방제효과

총채벌레
약제처리

더듬이가 꼬불어져
활동을 못함

트립솔 처리 2일후

총채벌레
약제처리

신경차단으로
치사에 이르게함

트립솔 처리 2일후

바이러스
미발생

저항성 관리 제품
효과적인 방제

트립솔 처리

바이러스
발생

저항성 발현으로
약제처리 후 발생

무처리구

시험성적

